



GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Par mesure de précaution, il est préférable de ne pas utiliser ce médicament au cours de la grossesse et de l'allaitement **D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT**

CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES

La prise de ce médicament peut entraîner des étourdissements, des vertiges, une somnolence, de la fatigue et des troubles visuels

Dans ces cas, la capacité à réagir peut être diminuée

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE : Saccharose

4- COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie

Maladie ulcéreuse gastro-duodénale :

- 1 gélule par jour pendant 4 à 6 semaines,

- **ou**, en cas de présence d'une bactérie (*Helicobacter pylori*) :

1 gélule matin et soir associée à deux antibiotiques pendant 7 jours.

Oesophagite : 1 gélule par jour pendant 4 à 8 semaines.

Syndrôme de Zollinger-Ellison :

La posologie initiale recommandée est de 2 gélules une fois par jour. La posologie doit être ajustée individuellement et le traitement poursuivi aussi longtemps que nécessaire cliniquement. Pour des posologies supérieures à 4 gélules par jour, la dose journalière devra être divisée et donnée en 2 prises (matin et soir).

Traitement des lésions gastro-duodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens : 1 gélule par jour pendant 4 à 8 semaines

Voie et mode d'administration

Voie orale.

Avalez la gélule avec un verre d'eau. Si vous trouvez que les gélules sont difficiles à avaler, votre médecin peut vous conseiller d'autres façons de prendre le médicament. N'écrasez ou ne croquez pas les gélules ou leur contenu car cela altérerait leurs propriétés

Si vous prenez IPPZOR une fois par jour, essayez de le prendre à la même heure chaque jour. Vous pouvez obtenir de meilleurs résultats si vous prenez IPPZOR deux que vous vous levez le matin.

Rebouchez soigneusement le flacon après chaque prise

5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

On a été rapportés :

- Fréquemment : maux de tête, étourdissement, diarrhées, constipation, douleurs abdominales, vomissements, nausées, flatulences, sécheresse de la bouche ou de la gorge, urticaire, prurit, rash, perturbation du bilan hépatique, fatigue
- Peu fréquemment : dépression, douleur musculaire, articulaire, œdème, thrombopénie, éosinophilie, leucopénie

- Rarement : anémie, insomnie, hallucination, confusion, vertiges, paresthésie, somnolence, tremblements, troubles visuels, glossite, candidose oesophagienne, altération du goût, pancréatite, hépatite, ictère, chute des cheveux, érythème polymorphe, photosensibilité, problèmes aux yeux, gynécomastie, fièvre, œdème de Quincke, anorexie, impuissance. **SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE**

6- CONSERVATION

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

Précautions particulières de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C

Conserver le flacon soigneusement fermé dans l'emballage extérieur, à l'abri de l'humidité

7- PRESENTATION

- Boîte de 14 gélules AMM N° : 925 352 2

- Boîte de 28 gélules AMM N° : 925 352 3

CECI EST UN MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
- un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
- Suivez les conseils de votre pharmacien.
- Ne le repérez pas, n'en augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

Ne laissez jamais les médicaments à portée des mains des enfants

این هدا دواء

- الدواء مستحضر ولثة ليس كغيره من المستحضرات.
- الدواء مستحضر يؤثر على صحتك واستهلاكه خلافا لتعليمات ممرضتك للحمل.
- إن الذي يخالص الصيدلي الذي صرفها لك، لا تعد إلى تناول الدواء ولا تزيد عليها بدون استشارة الطبيب.

لا تترك الاوعية أبداً في متناول ايدي الاطفال

AP07502

IPPZOR® 30 mg

Lansoprazole

Gélules gastro-résistantes

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Elle contient des informations importantes sur votre traitement

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire

1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Lansoprazole 30 mg

Excipients : saccharose, lactose de sodium, mellemnine, mannitol, hypromellose, macrogol 6000, talc, polysorbate 80, dioxyde de titane, copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1 : 1) (Eudragit L30 D-55) q.s.p. une gélule.

Enveloppe de la gélule : Tête : gélatine, dioxyde de titane, érythrosine, jaune de quinoléine ; Corps : gélatine, dioxyde de titane

Forme pharmaceutique

Microgranules gastro-résistants en gélule.

Boîte de 14 gélules et boîte de 28 gélules.

Classe pharmaco-thérapeutique

INHIBITEURS DE LA POMPE A PROTONS

(A : appareil digestif et métabolisme).

2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications thérapeutiques

Ce médicament est indiqué dans le traitement de :

- L'ulcère de l'estomac ou du duodénum, qu'il soit associé ou non à la présence d'une bactérie (*helicobacter pylori*)
- L'oesophagite (inflammation de l'oesophage)
- Le syndrome de Zollinger-Ellison
- Le traitement des lésions gastro-duodénales induites par les anti-inflammatoires non stéroïdiens

3- ATTENTION !

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Contre-indications

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas d'allergie au lansoprazole ou à l'un des excipients

Ce médicament ne doit pas être administré avec de l'atazanavir

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISES EN GARDE SPECIALES

- Avant tout traitement par Lansoprazole, il convient d'exclure une éventuelle malignité gastrique lors du traitement de l'ulcère gastrique

- Signaler à votre médecin, si vous êtes atteint d'une maladie hépatique sévère ou modérée

- Le traitement peut conduire à une légère augmentation du risque d'infections gastro-intestinales due à une diminution de l'acidité gastrique

- Un suivi régulier du traitement doit être réalisé chez les patients soumis au traitement d'entretien pendant plus d'un an

- La survenue d'une diarrhée persistante au cours des premiers mois de traitement peut évoquer une colite (voir Effets indésirables) et ainsi conduire à interrompre le traitement

- En raison de la présence de saccharose, ce médicament est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en sucrase-isomaltase.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Utiliser ce médicament avec PRECAUTION en cas d'affections chroniques du foie

L'utilisation d'IPPZOR n'est pas recommandée chez l'enfant

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, parlez-en à votre médecin, IPPZOR peut modifier les propriétés de certains médicaments.

Pour de meilleurs résultats, prenez IPPZOR au moins 30 minutes avant les repas

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN MEME S'IL S'AGIT D'UN MEDICAMENT OBTENU SANS ORDONNANCE



Laboratoires TERIAK
Cheylus 1111 - Zaghouan

